



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, എറണാകുളം ജില്ല

പ്രവചന കാലയളവ് 26.11.2025 മുതൽ 30.11.2025 വരെ

വെള്ളാനിക്കര കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ

കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗവും

ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്

എ എ എസ് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 47/2025 (94) ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 25/11/2025

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം :

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	26.11.2025	27.11.2025	28.11.2025	29.11.2025	30.11.2025
മഴ (മില്ലി മീറ്റർ)	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2
ഉയർന്ന താപനില (°C)	31	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	75	75	75	75	75
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	70	70	70	70	70
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	2	3	3	2	2
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	290	320	320	320	270
മേഘ വ്യൂപ്തി (ഒക്ടാ)	4	5	4	4	5

കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്പ്:- വരണ്ട അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാൽ ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വിളകൾക്ക് നന കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവ് മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

വിള പരിപാലനത്തിനുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും (RRS Vyttila)

പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ:- കാർഷികവിളകളിൽ രോഗകീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മണ്ണിന്റെ ഊർപ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ വിളകൾക്ക് ശരിയായ പുതയിടൽ രീതി അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ, വിള പരിപാലനം	കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല് (മുണ്ടകൻ)	പോള ചീയൽ / കട ചീയൽ	ഹെക്ടോകോണസോൾ 5 ഇ സി 1.5 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക
തെങ്ങ്	കായ ചീയലും കായ പൊഴിച്ചിലും (ലാസിയോ ഡിപ്ലോഡിയ)	കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞു വീണ മച്ചിങ്ങകൾ നീക്കം ചെയ്യുക, പത്തു ശതമാനം വെള്ളത്തുള്ളി സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൻഡാസിം 1 മി.ലി. / ഹെക്ടോകോണസോൾ 1.5 - 2 മി.ലി./ കാർബൻഡാസിം 12% + മാങ്കോസബ് 63% 2 ഗ്രാം എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് പുതിയ പൂങ്കലകൾ ഒഴിവാക്കി തളിക്കുക.
മഞ്ഞൾ	ഇലകരിച്ചിൽ	കാർബൻഡാസിം + മാങ്കോസബ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കോസബ് 3 ഗ്രാം / ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1 % ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കാം. വിള പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. രോഗം ബാധിച്ച ചെടികളിൽ നിന്നും വിത്ത് എടുക്കാതിരിക്കുക. വിത്ത് മഞ്ഞൾ ബോർഡോ മിശ്രിതത്തിൽ അര മണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ച തണലിൽ ഉണക്കിയ ശേഷം സൂക്ഷിക്കുക
വൃക്ഷ വിളകൾ	പിങ്ക് രോഗം	ഹെക്ടോകോണസോൾ 5 ഇ.സി. 2 മി.ലി. ഒരു ലി. വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. മഴ മാറിയ ശേഷം രോഗ ബാധിതമായ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം മുറിവിൽ 10 % ബോർഡോ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് (10 ഗ്രാം./ലി.) തേച്ചു കൊടുക്കുക.
മഞ്ഞൾ, പയർ, ചേന	സ്ക്വീറോഷ്യം (ചീയൽ രോഗം)	രോഗം ബാധിക്കാത്ത നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക. രോഗ ബാധയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.2 % മാങ്കോസബ് / കാർബൻഡാസിം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈക്കോഡെർമ്മ (5 ഗ്രാം / കി.ഗ്രാം. വിത്ത്) ചാണക പാലിൽ ലയിപ്പിച്ചത്, 0.7 % നന്മ എന്നിവയിലേതിലേങ്കിലും പരിചരിച്ച് തണലിലുണക്കി സൂക്ഷിക്കുക. നട്ടുന്നതിനു മുൻപായി ട്രൈക്കോഡെർമ്മ (5 ഗ്രാം / കി.ഗ്രാം. വിത്ത്) ചാണക പാലിൽ ലയിപ്പിച്ച ലായനിയിൽ മുക്കിയിട്ടു നട്ടുക.

മത്സ്യ കൃഷി-മത്സ്യ കർഷകർക്ക് കളമൊരുക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. തിളപ്പിയ, അനാബസ് എന്നീ മത്സ്യങ്ങൾ ആദ്യ മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ്.