



കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 28.10.2023 മുതൽ 01.11.2023വരെ)



കാസറഗോഡ് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഇം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻസ്: പിലിക്കോട്/കെ.എസ്.ഡി.-86/2023

തീയതി: 27/10/2023

എ.പിനിട നാല്പു ദിവസത്തെ കാലാവസ്യം

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറവെന്നതു താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
0.0	33.0 – 33.5	24.5 – 25.2	73– 92	01 - 03

ബി.വരുനാഞ്ചേർവിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്


സൂചിക	28-10-2023	29-10-2023	30-10-2023	31-10-2023	01-11-2023
ശരാശരിമഴ, മി.മീ	0.5	6	3	5	1
കൂടിയതാപനില, °C	34	34	34	34	34
കുറവെന്നതു താപനില, °C	24	24	24	24	24
കൂടിയആപേക്ഷിക ആർഭത, %	84	86	88	90	86
കുറവെന്നതു ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	70	72	74	75	78
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	2	2	2	2	2
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	230	290	290	270	250
മേഘവിന്ധ്യാസം, ഒക്ട്ടാ	7	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അല്പം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
ശക്തികുറവെന്നത മഴ **			
<u>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</u>	<p>ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെട്ടു. ആകാശം പുരും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഉഖ്താവും രാത്രികളിൽ കുറവെന്നതു താപനിലയും അനുഭവപ്പെട്ടു.</p> <p>കെട്ടോബർ 27 മുതൽ 31 വരെ ശക്തികുറവെന്നതു മഴ(ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറിൽ 2.5 മില്ലിമുതൽ 15.5 മില്ലിവരെ) ലഭിക്കും.</p>		

<p><u>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>തെങ്ങ്, ഇലമ്പി, വാഴ എന്നീ വിളകൾക്ക് ചീച്ചൽ, വാട്ടം എന്നീ രോഗങ്ങൾ പടരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത വിളകൾക്ക് താഴെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലോംബിക്കുക.</p> <p>വിണുകിടക്കുന്ന തെങ്ങാം, അടക്ക എന്നീവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം.</p> <p>വാഴ പോലുള്ള മുദ്രകാണ്ഡവും എളുപ്പത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമായ വിളകൾക്ക് താങ്ങുകൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കും</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവാഡി, മണ്ണതൾ, കൊപ്പ, വള്ളം എന്നീവ സുരക്ഷിതമാക്കി സൃഷ്ടിക്കുക.</p> <p>പല്ല്യമാകുന്ന മഴവെള്ളം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പരമാവധി സംഭരിക്കാനായാൽ വരൾച്ചയെ ചെറുകുന്നതിന് സഹായകരമാവും.</p> <p>മഴക്കുഴികളിൽ തുറന്നു പോയവ വീണ്ടെടുക്കുക.</p> <p>വിളകളുടെ തട്ടത്തിൽ കർണ്ണിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതയിട്ടുക.</p> <p>വൃക്ഷ വിളകൾക്ക് വള്ളം ചേർത്തത്തിന് ശേഷം മുഴുവനായും മുടാതെ തടങ്ങൾ നല്കി ജലസംഭരണികൾ കൂടിയാണ്. പറമ്പിൽ ലഭിച്ചു പോകുന്ന വെള്ളം ചാലുകൾ എടുത്തു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും.</p>		
<p>പച്ചക്കർക്കൾ</p>	<p>തെതകൾ</p>	<p>മണ്ണിൽ, സെസ്റ്റ് നേനിന് നാല് കിലോ വീതം കുമ്മായം വിതരുക. കുടാതെ ടൈറ്റക്കോഡൈർമ്മ സമ്പൂഷ്ടമാക്കിയ ചാണകമോ കമ്പോഡീസ്സാ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവ വാട്ട് രോഗങ്ങളെ ചെറുകുന്നതിന് സഹായിക്കും.</p> <p>പരിച്ചു നടുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്നേ വേര് പ്രസ്തുതോമാണാസ് ലായൻി (20മില്ലി. പ്രസ്തുതോമാണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ)-ൽ അര മൺകുർ മുക്കി വെക്കുക. നേരിട്ട് വിത്ത് നടത്താണെങ്കിൽ തെതകൾക്ക് ലായൻി ഇലകളിൽ താഴിക്കുക. ഇത് തെതകൾ കരുതേതാട വളരുന്നതിന് സഹായകമാകും.</p>	
<p>തെങ്ങ്</p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>ചെന്വൻ ചെല്ലി</p> 	<p>നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ:-</p> <p>നേർപ്പിച്ചു ഇമ്പിലാക്കണ്ടോർപില്ല് (1മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) ലായൻി ചെല്ലി തുരന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നെയെ ഒഴിക്കുക.</p> <p>തോട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം അവലോംബിക്കുക.</p>
<p>കുരുമുളക്</p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>ചീച്ചൽ രോഗം</p> 	<p>മുൻകരുതലായി ടൈറ്റക്കോഡൈർമ്മ സമ്പൂഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിസ്റ്റാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തട്ടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രിഡോമിൽ രണ്ണു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തട്ടതിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും താഴിക്കുക.</p>

വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലപുള്ളി രോഗം 	തടത്തിൽ വെള്ളം കൈട്ടിനിൽക്കാൽ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. മുൻകരുതലായി സൃഷ്ടേയാമോസംസ് ലായനി (20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയത്) രണ്ടാഴ്യിടവേളകളിൽ തളിക്കുക രോഗം ബാധിച്ചാൽ:- രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. കാർബൺഡാസിം അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കോസബ് ഇവ രണ്ടാഴ്യിടവേളയിൽ മാറി മാറി 2 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക
കശുമാവ്	കായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഘട്ടം	തേയില കൊതുക് 	ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ഭോർഡോ മിശ്രിതത്തിൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ 2 മില്ലി വീതം കീനാൽഫോസ് ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഹണ്ണി,	വിവിധ ഘട്ടം	ഫ്രുംസേറിയം വാട്ടം 	നീർവാർച്ച സാകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക. കോപർ ഓല്ലി ക്ഷോദരോധ്യ് ഒരുലിറ്റർ വെള്ളത്തില് രണ്ടുഗ്രാം വീതം കലർത്തി തടത്തിൽ ഒഴിപ്പ് കൊടുക്കുക
മഞ്ഞൾ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇല കരച്ചിൽ	ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച ഇലകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിലിടുക. ചെടികളിൽ കോപർ ഓല്ലിക്കോദരോധ്യ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.
വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിള	വളർച്ചാ ഘട്ടം	മുദ്രുരോമ പുഷ്ടം രോഗം 	വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ മുദ്രുരോമ പുഷ്ടം രോഗം പടരാൻ സാധ്യത. മുൻ കരുതലായി മാങ്കോസബ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇലകളുടെ ഇരു വശത്തും തളിക്കുക. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അക്കോമിൽ 3 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തളിക്കുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക

പരു	വിവിധപ്പട്ടം	<p>പാറ, വായ രോഗം</p>  	<p>അപ്പത്തോന്തവീസ് അണ്ണുബാധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വളരെയേറെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കാൽ, വായ് രോഗം. അണ്ണുബാധയുടെ ഫലമായി വായിലും ചുറ്റപാടും കാലുകളിലും വെസിക്കുലാർ നിവേദം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി രൂഗ മുറം ക്ഷേണം കഴിക്കാനോ നീങ്ങാനോ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു.</p> <p>പ്രതിരോധം: വ്യക്തിഗത മുഗ്ധങ്ങൾക്കും അവയുടെ പാർപ്പിടിത്തിനും ചുറ്റപാടുകൾക്കും ശുചിത്വ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. ഹൈത്തൽ ടോൺിക്കുകൾ അടങ്കിയ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അടങ്കിയ തീറ്റകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കനുകാലികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രോഗം വന്നാൽ ഉടൻ വെറ്റിനി ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മരുന്ന് നൽകുക.</p>
-----	--------------	--	--

****മുഖ അപായ വർഗ്ഗ സൂചന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)**

താക്കിത് (ഉടൻനടപടിയെടുക്കുക)

ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)

ശ്രദ്ധ
(കാത്തോർക്കൂക)

നിസ്വാരം
(നടപടികൾആവശ്യമില്ല)

ഒപ്പ്/-
നോയൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷികാലാവന്ധനേവപദ്ധതി

